

NIHSS (National Institutes of Health Stroke Scale)

項目	検査	尺度
意識 (覚醒度)		0 清明 1 傾眠 (呼びかけで覚醒) 2 混迷 (強い刺激で覚醒) 3 半～深昏睡 (刺激しても覚醒しない)
意識 (応答)	月と年齢の質問	0 両方とも正解 1 一方のみ正解 2 両方とも誤りまたは応答なし
意識 (従命)	眼または手の開閉	0 両方とも正しく行う 1 一方のみ正しく行う 2 両方とも正しく行わない
眼球運動障害		0 正常 1 眼球偏位なし、不全麻痺 2 眼球偏位または完全麻痺
視野異常	顔面で検者の指を動かす	0 明らかな左右非対称なし 1 部分的半盲 2 完全半盲またはそれ以上の狭窄 3 両側半盲 (全盲)
顔面麻痺		0 正常 1 軽微 2 不全 3 完全
上肢運動	伸展挙上位の保持; 坐位で90°、背臥位で45°、麻痺側を検査	0 10秒保持可能 1 保持可能だが10秒間以内に降下 2 保持できないが、落下にいくらか抗する 3 落下に抗しない 4 完全麻痺
下肢運動	伸展挙上位保持; 背臥位で30°、麻痺側を検査	0 5秒間保持可能 1 保持可能だが5秒以内に降下 2 保持できないが、落下にいくらか抗する 3 落下に抗しない 4 完全麻痺
四肢失調症	指鼻および踵脛検査; 麻痺と不釣り合いなら失調症と判定	0 なし、または検査不能 1 あり: 1肢のみ 2 あり: 2肢以上
感覚	ピンプリック検査; 明らかな左右非対称の実を異常とする	0 正常 1 痛覚鈍麻、痛覚脱失だが触覚あり 2 痛覚と触覚の脱失
無視		0 正常 1 視覚、触覚または聴覚の片側不注意 2 視覚、触覚、聴覚の二つ以上の重度片側不注意
構音	明瞭度の低下を判定; 失語がないか、失語の不釣り合いな場合を構音障害とする	0 正常 1 聴き手の努力で理解可能 2 理解不可能
言語	絵カードの呼称と単語の音読、NIHSS全体での聴覚的理解	0 正常 1 呼称、音読の誤り、錯誤、軽度～中等度失語 2 明らかなBrocaまたはWernicke失語、重度失語 3 無言、全失語